

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

Nordwest-
sächsische
Scholle

Nordsudetische
Senke

5700
000

Lausitzer Scholle

5650
000

Granulit-
Erzgebirgsscholle


Vogtland-Scholle


5600
000


Tektonische Übersichtskarte von Sachsen 1:400.000

Teil 1, Neotektonik

0 25 50 75 100 km















Tektonische Übersichtskarte von Sachsen 1:400.000

Teil 4, Spät-Paläozoisch-Frü-Mesozoische Tektonik

Geotektonische Einheiten		Störungstypen	
 Tertiär	 Varistische metamorphe Komplexe (amphibolit-faziell und höher)	 Blattverschiebung	
 Mesozoikum (P ₂ -K ₂)	 alt-paläozoische Sedimente und Vulkanite (ε-C ₁) (schwach metamorph - grünschieferfaziell)	 Aufschiebung	
 „Molasse“ (C ₂ -P ₁)	 Cadomische Granitoide (PR ₃ -O ₁)	 Abschiebung	
 post-varistische Granitoide	 Prä-Cadomische Sedimente (PR ₃)	 unbestimmt	
 post-varistische Calderen	 Gebiete unsicherer Verbreitung der geotektonischen Einheiten	 post-varistisch	
	 tectonisch detailliert untersuchte Gebiete	 post-Molasse	
		 spät-mesozoisch	
		 post-Miozän	
		 geomorphologisch indiziert	

0 25 50 75 100 km

Stand: 2016

